



# — HBP —

## **HIPERPLASIA BENIGNA DE PRÓSTATA**

La hiperplasia benigna de próstata (HBP) es una enfermedad frecuente en hombres mayores de 50 años.

Está causada por un aumento en el número de células de la próstata, haciendo la glándula más grande. El aumento del tamaño de la próstata puede causar problemas en la evacuación vesical.

“

El tratamiento de la HBP va dirigido a eliminar la obstrucción producida por el aumento de tamaño de la próstata. Los medicamentos no son eficaces para resolver completamente este problema. **La única cura definitiva del proceso se consigue por la cirugía**

”

## Tratamientos

El **láser verde** muestra una excelente capacidad terapéutica en el **tratamiento quirúrgico de la HBP de tamaño medio**. Equiparable en eficiencia y superando en seguridad las técnicas quirúrgicas tradicionales.

Actualmente es **una de las mejores opciones** para tratar esta patología.

El **Láser Green Light XPS** aumenta considerablemente el rendimiento del tratamiento, tanto por incremento de la potencia de vaporización y enucleación del tejido obstructivo, así como de la eficiencia de la fibra láser utilizada.

En **próstatas de tamaño grande**, tiene especial utilidad la enucleación prostática con **láser de Holmio** y, especialmente, la **Enucleación Robótica** del Adenoma de Próstata.

La **Cirugía Robótica** es la técnica **más novedosa y menos invasiva**, permitiendo el tratamiento de Adenomas de Próstata voluminosos y complicados con cálculos y/o divertículos de la vejiga, situaciones en las que es el tratamiento idóneo.



La **HBP** es una enfermedad que **puede derivar en complicaciones si no se trata adecuadamente.**

Sin embargo la HBP no deriva directamente en el cáncer de próstata, que también aparece en hombres de esta edad.

“ Al principio, los síntomas suelen ser leves debido a que el músculo de la vejiga es capaz de compensar la presión del agrandamiento de la próstata sobre la uretra

”

## Síntomas

La presión de la próstata en la uretra produce un debilitamiento o interrupción del flujo de orina.

### Otros síntomas incluyen:

- Dificultad para empezar a orinar
- Permanencia de las ganas de orinar tras haber orinado
- Sensación de no haber vaciado la vejiga por completo

### Cuando aparecen complicaciones se puede notar:

- Micción dolorosa
- Necesidad de vaciar la vejiga constantemente, especialmente por la noche
- Sensación de urgencia que acompaña a la necesidad de orina



## Complicaciones

Las complicaciones severas pueden ocurrir si la vejiga no se vacía por completo.

La orina que permanece en la vejiga puede producir el crecimiento bacteriano, que puede causar **infecciones en el tracto urinario**.

Además, los **cálculos urinarios** se pueden formar en el interior de la vejiga debido a una acumulación de residuos.

También se pueden producir desgarros en las venas que recubren la próstata y aparecer **sangre en la orina**, con obstrucción e imposibilidad para orinar y eliminar coágulos.

Si no se trata, la orina retenida en la vejiga va aumentando hasta ascender a los riñones, dilatándolos y produciendo lesiones irreversibles e **insuficiencia renal**.

# Hospital Vithas Nuestra Señora de América

Unidad de Urología y Andrología  
Edificio Vithas Salud  
Calle Arturo Soria 105, 4ª planta  
28043 Madrid

## Policlínico Núñez de Balboa, 107

3ª Planta, Despachos 301 y 308  
28006 Madrid



91 781 66 29  
71 719 01 89



[info@unidaddeurologia.com](mailto:info@unidaddeurologia.com)



Pide cita online en nuestra web  
[www.uroand.com](http://www.uroand.com)



Mi Urólogo TV



[@miurologo](https://twitter.com/miurologo)



[@UnidaddeUrologia](https://www.facebook.com/UnidaddeUrologia)



[UroAnd](https://www.linkedin.com/company/UroAnd)

